

BEDFORD ALZHEIMER NURSING SEVERITY SCALE (BANSS)

(Volicer L., Hurley A.C., Lathi D.C., Kowall N.W., J. Gerontology, 49:M223-M226, 1994)

Nome

Data

- ABBIGLIAMENTO** [1] abitualmente indipendente
[2] richiede assistenza minima
[3] richiede discreta assistenza ma non è totalmente dipendente
[4] completamente dipendente
- SONNO** [1] ciclo sonno-veglia abitualmente regolare
[2] talvolta irregolare
[3] frequentemente irregolare
[4] ciclo sonno-veglia severamente sovvertito
- LINGUAGGIO** [1] conservato
[2] lieve incapacità a parlare
[3] saltuaria incapacità
[4] afasia completa
- ALIMENTAZIONE** [1] indipendente
[2] richiede assistenza minima e/o sollecitazione
[3] richiede moderata assistenza e/o sollecitazione
[4] completamente dipendente
- MOBILITÀ** [1] deambula sempre in modo indipendente
[2] talvolta deambula in modo indipendente
[3] deambula solo con aiuto
[4] incapace a deambulare anche con aiuto
- MUSCOLATURA** [1] molto sciolta con motilità articolare pienamente conservata
[2] parzialmente sciolta con lieve compromissione della motilità articolare
[3] parzialmente rigida
[4] contratta
- CONTATTO OCULARE** [1] mantenuto
[2] abitualmente mantenuto
[3] raramente mantenuto
[4] completamente perduto

PUNTEGGIO COMPLESSIVO _____/28

Nelle fasi avanzate della demenza, la grande maggioranza delle scale di valutazione delle funzioni cognitive e delle performance funzionali perdono la propria sensibilità nell'identificare ulteriori progressioni della malattia.

Al fine di ottenere uno strumento in grado di differenziare le condizioni cognitive e funzionali dei pazienti che non possono essere testati tramite strumenti come il MMSE o il Barthel Index è stata elaborata la Bedford Alzheimer Nursing Severity Scale (BANSS). La versione proposta è quella validata dal gruppo di Ricerca Geriatrica di Brescia (G. Bellelli, G.B. Frisoni, A. Bianchetti, M. Trabucchi: *The Bedford Alzheimer Nursing Severity scale for the demented: validation study. Alzheimer's Disease and Related Disorders*, 11:71-77, 1997).

La BANSS fornisce informazioni sul grado di compromissione cognitiva (linguaggio e contatto oculare) funzionale (abbigliamento, alimentazione, deambulazione) e sulla presenza di sintomi patologici (alterazioni del ciclo sonno-veglia, rigidità muscolare/contratture). La BANSS consente di ottenere informazioni sulle condizioni cognitive /funzionali del paziente finché quest'ultimo raggiunge lo stato vegetativo. La compilazione della BANSS si esegue utilizzando le informazioni del personale di assistenza e l'esame obiettivo del paziente.

Il punteggio ottenuto oscilla tra 7 e 28 ed è direttamente proporzionale al livello di gravità della malattia.